

# PROTOCOLLO DI DEPARASSITAZIONE

## TREMENTINA, OLIO DI RICHINA, SOLFATO DI MAGNESIO



Per espellerlo, una volta veniva fornita una forte dose di uno o due cucchiaini di essenza di trementina, generalmente mescolata con la stessa quantità di olio di ricino nel latte. Questo è stato ripetuto ogni due o tre giorni, fino a quando i frammenti di verme non hanno smesso di apparire nelle feci. Estratto dal Prohibited Health Book di Andreas Kalcker.

### Fase 1:

- 1) Prima di andare a letto, prendi 1 cucchiaino di olio di ricino con acqua.
- 2) Quindi diluire un cucchiaino di solfato di magnesio in un bicchiere d'acqua, una volta sciolto prendere
- 3) Quindi versare 6 gocce di Trementina in meno di mezzo bicchiere d'acqua.
- 4) Il dosaggio della trementina nei primi 8 giorni è il seguente:

### Trementina

- Giorno 1: 6 gocce
- 2° giorno: 12 gocce
- 3° giorno: 18 gocce
- 4° giorno: 24 gocce
- 5° giorno: 30 gocce
- 6° giorno: 36 gocce
- 7° giorno: 42 gocce
- 8° giorno: 48 gocce



*Olio di ricino e magnesio continua nella stessa dose di notte dal primo giorno della fase 1 fino alla fine dell'intera vermifugo.*



## Fase 2:



1) Dal giorno 9 al giorno 30 Continuare a prendere 10 gocce di Trementina. Quando raggiungi quel giorno 30, riposa una settimana, questo è così che i parassiti credono di non essere più attaccati.

2) Dopo la settimana di riposo, iniziare lo stesso protocollo con 10 gocce di trementina e le stesse dosi di olio di ricino e magnesio, dalla fase 1. Per 21 giorni e riposare per la seconda volta a settimana.

**Fase 3:** Dopo la seconda settimana di riposo, inizia lo stesso protocollo con 10 gocce di trementina e le stesse dosi di olio di ricino e magnesio, dalla fase 1. Per 21 giorni. Qui completiamo 3 mesi di sverminazione.

### **Raccomandazioni importanti:**

- **L'utilizzo di Olio di Ricino e Magnesio è fondamentale, poiché deve essere evacuato almeno 2 o 3 volte al giorno e questi consentono la sverminazione senza alcun trauma. Se non si ottengono 3 movimenti intestinali, aumentare a 2 cucchiaini di ricino; oppure prendi 1 cucchiaino di semi di ricino e 1 cucchiaino di magnesio al mattino.**
- **Prendi la trementina di notte, poiché il biossido di cloro viene assunto durante il giorno, non possono essere presi insieme perché uno è un ossidante e l'altro un antiossidante e può avere un effetto breve.**
- **È importante annotare il giorno in cui inizia, si interrompe la sverminazione, ecc. in modo da avere un controllo della data.**
- **NON bere bevande alcoliche durante tutta la sverminazione, perché potrebbe esserci avvelenamento, non da trementina, ma da agenti patogeni che lo provocano.**
- **Se hai intenzione di bere alcolici, devi sospendere la sverminazione in anticipo di 5 giorni, ma l'ideale è che il consumo di alcolici sia vietato e non interrompere il processo. Evita zucchero, farina e latticini.**
- **Se hai la diarrea molto frequentemente, interrompi il magnesio e il ricino, o riduci la quantità di questi, l'importante è avere 2 movimenti intestinali abbondanti al giorno, o 3 movimenti intestinali normali al giorno. Se non fai questi movimenti intestinali dovresti aumentare le ruote e il magnesio, ascolta il tuo corpo.**

**Doc. Foreman Sì**

**Contatto: 316 7073644 Colombia**



**ORO LÍQUIDO COLOMBIA**



**PROTOS Y SUPLEMENTOS DE SALUD MÉXICO Y COLOMBIA**

